

ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประเทศไทยสามารถพบสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั่วประเทศ โดยผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้ากว่าร้อยละ 50 ติดเชื้อจากสัตว์ที่มีเจ้าของ เนื่องจากการเลี้ยงแบบปล่อยทำให้สัตว์เลี้ยงมีโอกาสได้รับเชื้อจากการถูกสัตว์ติดเชือกัด ข่วน หรือเลีย กรมควบคุมโรคขอแนะนำให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 9 มีนาคม 2568 ประเทศไทยมีรายงานการพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 2 ราย ที่จังหวัดชลบุรีและศรีสะเกษ ทั้ง 2 ราย ถูกสุนัขกัดแล้วไม่ไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค และมีการรับเลี้ยงสุนัขจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ในปีนี้มีการพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน 54 ตัว จากการส่งตรวจทั้งหมด 835 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.47 พบสัตว์ติดเชือสุนัข 3 อันดับ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขอนแก่น และมหาสารคาม โดยมีการพบเชื้อในสุนัขมากถึงร้อยละ 75.93 รองลงมา ได้แก่ โค กระบือ และแมว คิดเป็นร้อยละ 16.66 และ 7.41 ตามลำดับ

กรมปศุสัตว์จึงได้ออกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมโรคในสัตว์ให้ได้ภายใน 30 วัน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากสัตว์ไปยังพื้นที่อื่น และให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตนเอง ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก และสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทำได้โดยการใช้คาถา 5 ย. ได้แก่ “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง ” อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห อย่าเหยียบสุนัข หรือทำให้สุนัขตกใจ อย่าแยกสุนัขที่กำลัง กัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบขามอาหารขณะสุนัขกำลังกิน และอย่ายุ่งกับสุนัขนอกบ้านหรือที่ไม่ทราบประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือซากสัตว์ที่เสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือดื่มน้ำนมสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

หากประชาชนถูกสุนัข กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบ “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามอม ฉีดวัคซีนให้ครบ ” คือให้รีบล้างแผลด้วยน้ำ และสบู่ นาน 10 - 15 นาที ใส่ยาฆ่าเชื้อ รีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุด กักสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสัตว์เสียชีวิตให้ส่งสัตว์ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ผู้เลี้ยงควรนำสุนัข และแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์อยู่สูงถึงระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

พิษสุนัขบ้า ฆ่าได้ ทุกชีวิต



โรคพิษสุนัขบ้า (โรคกลัวน้ำ)
 เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระแต ลิง ชะนี วัว และควาย เป็นต้น สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข

การติดต่อ

- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือข่วน
- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือเลียหรือเลียลายสัตว์ กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วน หรือ จมูก ปาก และตา
- ✓ ติดต่อกับการหายใจ มักเกิดจากมีจำนวนไวรัสในอากาศเป็นจำนวนมาก เช่น ในถ้ำค้างคาว
- ✓ ติดต่อกับการกินเนื้อสัตว์ที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า

อาการป่วย ที่พบในคน


มีไข้


เจ็บคอ


อ่อนเพลีย


คันบริเวณแผล


กลัวแสง / กลัวลม


เบื่ออาหาร


กระวนกระวาย


กลัวน้ำ


หนาวสั่น


หายใจขัด



เสียชีวิต

*** ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
คิดเชื้อแสดงอาการ
เสียชีวิตทุกราย

ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2568

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข




สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



คำแนะนำ เมื่อ ถูกกัด ข่วน เลีย



คำแนะนำเมื่อถูกกัด ข่วน เลีย


ล้างแผล
 ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง


ใส่ยา
 ใส่ยาเบตาดีน
บริเวณที่ถูกกัด ข่วน


กักหมา และแมว
 เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากตาย
ให้รีบส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า

ไปพบแพทย์
 เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
และมาตรฐานทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง

- ✓ นำสุนัข หรือแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- ✓ เลี้ยงในรั้วบ้าน ออกนอกบ้านต้องใช้สายลากถุง
- ✓ ฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง
- ✓ ทำหมันคุมกำเนิด

ฉีดวัคซีน
 ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
และตรงตามนัด

ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2568

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข




สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

